



ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата

ЛИНКО-ФУД 15%

(Организация-разработчик: S.P. Veterinaria, S.A. Ctra.Reus-Vinyols, Km.4.1, 43330, Riudoms (Tarragona), Spain / С.П. Ветеринария, С.А., Ктра.Реус-Виньольс, Км.4.1, 43330, Риудомс (Таррагона), Испания)

Номер регистрационного удостоверения: 724-3-25.23-5027 ППЧ-3-18.23/05992

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: «Линко-Фуд 15%» («LINCO-FUD 15%»)

Международное непатентованное наименование: линкомицин.

2. Лекарственная форма: порошок для перорального применения.

«Линко-Фуд 15%» в 1 г в качестве действующего вещества содержит 150 мг линкомицина (гидрохлорида), а в качестве вспомогательных веществ рафинированное арахисовое масло, скорлупу миндаля и фундука.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой порошок коричневого цвета.

Срок годности лекарственного препарата в закрытой упаковке производителя при соблюдении условий хранения - 2 года со дня производства, после первого вскрытия упаковки - 3 месяца. «Линко-Фуд 15%» запрещается применять по истечении срока его годности.

4. «Линко-Фуд 15%» выпускают расфасованным по 25 кг в термосвариваемые пакеты из ламинированной фольги. Каждую единицу потребительской упаковки снабжают инструкцией по применению.

5. «Линко-Фуд 15%» хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 5°C до 25°C.

6. «Линко-Фуд 15%» следует хранить в местах, недоступных для детей.
7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. «Линко-Фуд 15%» относится к антибактериальным лекарственным препаратам группы линкозамидов.

10. Линкомицина гидрохлорид является представителем класса пиранозидов-4-алкил замещенных гиграновой кислоты, оказывает бактериостатическое действие в отношении грамположительных аэробных и анаэробных бактерий, грамотрицательных анаэробов и микоплазмы. Линкомицин активен против возбудителей дизентерии (*Brachispira hyodysenteriae*) и илеита (*Lawsonia intracellularis*) свиней, *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Clostridium* spp., фузобактерий, а также, против микоплазменной (энзоотической) пневмонии (*Mycoplasma hyopneumoniae*). Механизм действия связан с угнетением синтеза белка микроорганизмов вследствие образования необратимой связи с 50S субъединицами рибосом и нарушением пептидилтрансферазной активности и ингибированием реакций транслокации и транспептидации.

После однократного перорального применения препарата линкомицин быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта и обнаруживается в системном кровотоке уже через 20 мин., проникая во многие органы и ткани. Время достижения максимальной концентрации антибиотика в крови целевых животных составляет 1-3 часа после применения препарата. Линкомицин выделяется из организма животных в неизменном виде преимущественно с мочой, фекалиями и пометом.

«Линко-Фуд 15%» по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

11. «Линко-Фуд 15%» применяют лечебной и лечебно-профилактической целью при дизентерии, илеите и микоплазменной пневмонии у свиней; при некротическом энтерите, вызванном *Clostridium perfringens*, у цыплят-бройлеров и индейки, а также, заболеваний, вызванных чувствительными к линкомицину возбудителями.

12. Противопоказанием к применению лекарственного препарата является индивидуальная повышенная чувствительность животных и птицы к компонентам препарата. Запрещается применение лекарственного препарата

племенной птице, а также, курам-несушкам, яйца которых используют в пищевых целях.

13. При работе с «Линко-Фудом 15%» следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. При работе с препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. После работы с лекарственным препаратом вымыть руки с мылом.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с «Линко-Фудом 15%». В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Пустые пакеты из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

14. Запрещается применение препарата «Линко-Фуд 15%» супоросным и кормящим свиноматкам.

15. «Линко-Фуд 15%» применяют перорально индивидуально или групповым способом в смеси с кормом. Вводят в комбикорма и кормосмеси на комбикормовых заводах или в кормоцехах хозяйств путем смешивания с зерновой частью, используя существующие технологии смешивания:

Свиньи - в дозе 750 г «Линко-Фуда 15%» / тонна корма, в течение 3-х недель или до исчезновения клинических признаков в случае лечения дизентерии и илента; в дозе 1500 г «Линко-Фуда 15%» / тонна корма, в течение 3-х недель или до исчезновения клинических признаков в случае лечения микоплазменной пневмонии.

Птица - в дозе 200-400 г «Линко-Фуд 15%» / тонну корма, в течение 7 дней для лечения некротического энтерита, вызванного *Clostridium perfringens*.

В период лечения животные и птица должны получать только корм, содержащий лекарственный препарат.

16. Побочных явлений и осложнений у свиней и птиц при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило не наблюдается. В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и при необходимости назначают симптоматическое лечение.

17. В случае передозировки может наблюдаться снижение прироста массы тела, диарея и изменение некоторых гематологических и биохимических показателей крови. В этом случае прекращают применение препарата.

18. Запрещается применение «Линко-Фуда 15%» одновременно с эритромицином, хлорамфениколом, ампициллином и другими бактерицидными антибиотиками в связи с возможным антагонистическим эффектом, линкомицин обладает синергизмом с аминогликозидами.

19. Особенности действия «Линко-Фуда 15%» при первом применении или при его отмене не выявлено.

20. Следует избегать пропуска очередной дозы «Линко-Фуда 15%», так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозе и по той же схеме применения.

21. Убой свиней на мясо разрешается не ранее, чем 2 суток, цыплят-бройлеров не ранее, чем через 5 суток, индейки не ранее, чем через 7 суток после последнего применения «Линко-Фуда 15%». Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанных сроков, может быть использовано для кормления пушных зверей.

Наименования и адрес
производственных площадок
производителя лекарственного препарата
для ветеринарного применения.

«S.P. Veterinaria, S.A.», Ctra. Reus -
Vinyols, Km 4.1, 43330 Riudoms
(Tarragona), Spain /
С.П. Ветеринария, С.А.,
Ктра. Реус - Виньолс, Км 4.1, 43330
Риудомс (Таррагона), Испания

Наименование, адрес организации,
уполномоченной держателем или
владельцем регистрационного
удостоверения лекарственного препарата
на принятие претензий от потребителя.

«S.P. Veterinaria, S.A.», Ctra. Reus -
Vinyols, km 4.1, 43330 Riudoms
(Tarragona), Spain /
С.П. Ветеринария, С.А.
Ктра. Реус - Виньолс, Км 4.1, 43330
Риудомс (Таррагона), Испания

Генеральный директор
С.П.Ветеринария, С.А.

 **s.p.® veterinaria, s.a.**
Ctra. Reus-Vinyols Km. 4.1 • 43330 RIUDOMS (Tarragona)
www.spveterinaria.com

Мария Франциска Марторель