



Ctra. Reus-Vinyols Km. 4,1 · Ap. Correos, 60
Tel. +34 977 768 864 · Fax +34 977 850 405 · 43330 RIUDOMS (Tarragona)
www.spveterinaria.com

1. Название: ПАРАЦЕТАМОЛ-30

Рег.номер: 724-3-1.0-0195 №ПВИ-3-10/03377

Раствор для орального применения

2. Состав:

Парацетамол 300 мг

Наполнитель до 1 мл

3. Вид животного и показания к применению:

Анальгезирующее и жаропонижающее средство. Рекомендуется назначать **свиньям, телятам, ягнятам** и **сельскохозяйственной птице** в качестве симптоматического средства при инфекционных и воспалительных заболеваниях, сопровождающихся гиперемической реакцией, а также при болевом синдроме различной этиологии.

4. Противопоказания:

Индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата, а также выраженная почечная и печеночная недостаточность.

5. Дозировка и способ введения:

Парацетамол-30 применяют один раз в день в течение 5 дней: **свиньям, телятам и ягнятам** *индивидуально* или *групповым способом* с водой для поения или с кормом в суточной дозе 30 мг/кг массы животного; **птице** – *групповым способом* с водой для поения в суточной дозе 0,5 мл на 1 л воды.

6. Период ожидания:

Убой животных, в том числе птицы, на мясо разрешается не ранее, чем через 24 часа после последнего применения препарата.

Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанных сроков, может быть использовано для кормления пушных зверей.



7. Предосторожности при применении препарата:

Беременным и лактирующим самкам препарат применяют с осторожностью под контролем ветеринарного врача.

Необходимо учитывать, что парацетамол усиливает действие салициловой кислоты, кофеина и спазмолитиков.

Не следует применять одновременно с рифампицином, барбитуратами, так как это может привести к усилению гепатотоксического эффекта и снижению жаропонижающего действия препарата, а также, во избежание передозировки, совместно с другими лекарственными средствами, содержащими парацетамол.

8. Меры личной профилактики.

При работе с Парацетамолом-30 следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством проточной воды.

9. Условия и сроки хранения: при соблюдении условий хранения Парацетамола-30 - в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 5°С до 25° С - срок годности лекарственного препарата - 2 года с даты производства, после вскрытия упаковки – не более 3 месяцев.

10. Упаковка: полиэтиленовые бутылки (1 литр) и канистры (5 литров) с навинчиваемыми крышками.