



Ctra. Reus-Vinyols Km. 4,1 · Ap. Correos, 60  
Tel. +34 977 768 864 · Fax +34 977 850 405 · 43330 RIUDOMS (Tarragona)  
[www.spveterinaria.com](http://www.spveterinaria.com)

**1. Название:** ПУЛЬМОБАС

Рег.номер: 724-3-36.12-1186 № ПВИ-2-5.7/02237

Раствор для инъекций

**2. Состав:**

Доксициклина (гиклат) ..... 20 г

Наполнитель ..... до 100 мл

**3. Вид животного и показания к применению:**

**Крупный рогатый скот:** пневмония, бронхопневмония или пастереллез, возбудители которых чувствительны к антибиотику

**Свиньи и овцы:** пневмония, бронхопневмония

**4. Противопоказания:**

Не применять животным с повышенной чувствительностью к тетрациклинам или с заболеваниями печени.

**5. Доза и способ введения:**

**Внутримышечно**

**Крупный рогатый скот и овцы:** 0,5 мл/10 кг массы животного, в течение 4-5 дней (10 мг доксициклина / кг живой массы)

**Свиньи:** 0,25 мл/10 кг массы животного в течение 4-5 дней (5 мг доксициклина / кг живой массы)

**6. Период ожидания:** убой свиней и крупного рогатого скота на мясо разрешается не ранее, чем через 21 дней после последнего применения Пульмобаса.



## **7. Предосторожности при применении препарата:**

Рекомендуется постановка пробы на выделение возбудителя заболевания и антибиограмма для определения чувствительности к антибиотику.

Не вводить больше 10 мл в одно и тоже место инъекции.

Использовать с осторожностью во время супоросности и стельности.

Не использовать во время лактации.

Передозировка может вызвать нервно-мышечную блокаду. В этом случае, ввести кальций внутривенно, неостигмин или физостигмин.

При завышенных дозах и длительном использовании, могут проявляться нефротоксический и ототоксический эффекты

Всасывание доксициклина может быть снижено в присутствии кальция, железа, магния или алюминия в диете животного

## **8. Меры личной профилактики.**

При работе с Пульмобас следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Пульмобас. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека, следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

**9. Условия и сроки хранения:** при соблюдении условий хранения - в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 5°С до 25° С - срок годности лекарственного препарата 2 года с даты производства.

**10. Упаковка:** полипропиленовый флакон емкостью на 100 мл, герметично упакованный бутылкаучкуовой пробкой и FLIP-OFF капсулой.