



Ctra. Reus-Vinyols Km. 4,1 · Ap. Correos, 60
Tel. +34 977 768 864 · Fax +34 977 850 405 · 43330 RIUDOMS (Tarragona)
www.spveterinaria.com

1. Название: ПНЕВМОВИРИК

Рег.номер: РК-ВП-4-1890-12

Водорастворимый порошок

2. Состав:

Доксициклина (гиклат) 6 г

Сульфаметоксипиридазин 15 г

Триметоприм 3 г

Наполнитель до 100 г

3. Вид животного и показания к применению:

Пневмовирик применяют для лечения **свиней, телят, овец и сельскохозяйственных птиц** при микоплазмозах и болезнях бактериальной этиологии. Лечение осложнений, вызванных бактериями, чувствительными к доксициклину, сульфаметоксипиридазину и триметоприму.

4. Противопоказания:

Индивидуальная повышенная чувствительность животных к компонентам препарата.

5. Дозировка и способ введения:

Пневмовирик применяют с водой для поения в течение 5 дней:

свиньи, крупный рогатый скот, овцы и козы: 1,6 г / литр;

птица: 0,8 г / литр.

В период лечения животные должны получать только воду, содержащую препарат. Лечебный раствор готовят ежедневно в объеме, рассчитанном на потребление животными в течение суток.



6. Период ожидания:

Убой на мясо разрешается не ранее: свиньи, телята, овцы, козы — 14 дней, птица - 10 суток после последнего применения препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления пушных зверей.

7. Предосторожности при применении препарата:

Запрещено применять Пневмовирик животным имеющим индивидуальную чувствительность к компонентам препарата, а также с почечной и печеночной недостаточностью.

Запрещается применение препарата курам-несушкам, яйца которых предназначены для пищевых целей.

8. Меры личной профилактики.

При работе с препаратом Пневмовирик следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с ветеринарными лекарственными препаратами. Во время работы с препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом Пневмовирик. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

9. Условия и сроки хранения: при соблюдении условий хранения - в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 5 до 25°C - срок годности лекарственного препарата 3 года со дня производства.

Приготовленный раствор использовать в течение 24 часов.

10. Упаковка: герметичные пакеты из ламинированной фольги по 1 кг.