



Ctra. Reus-Vinyols Km. 4,1 · Ap. Correos, 60
Tel. +34 977 768 864 · Fax +34 977 850 405 · 43330 RIUDOMS (Tarragona)
www.spveterinaria.com

1. Название: ТИА-ФУД

Рег.номер: ПВИ-2-9.9/02959

Микрогранулированный порошок для перорального применения

2. Состав:

Тиамулина гидрогенфумарат 10 г

Наполнитель до 100 г

3. Вид животного и показания к применению:

Тиа-фуд применяют для лечения и профилактики дизентерии, вызванной *B. hyodysenteriae* и энзоотической пневмонии, вызванной *M. hyopneumoniae* у **свиней**, а также других инфекций, возбудители которых чувствительны к тиамулину.

4. Противопоказания:

Запрещено использовать Тиа-фуд совместно с полиэфирными ионофорными препаратами, ввиду возможного возникновения у животных побочных явлений и осложнений (диарея, анорексия, парезы, нефротоксические эффекты), а также животным с выраженной почечной недостаточностью.

5. Дозировка и способ введения:

Тиа-фуд применяют животным в смеси с кормом в дозе: *для профилактики* 1 кг / тонна корма или *для лечения* 2 кг / тонна корма.

Для *профилактики* дизентерии, вызванной *B. Hyodysenteriae* рекомендуется дозировать из расчета 4 мг тиамулина / кг ж.м. / день в течение 10-14 дней

Для *лечения* дизентерии, вызванной *B. Hyodysenteriae* и энзоотической пневмонии вызванной *M. Hyopneumoniae* дозировать из расчета 8 мг тиамулина / кг ж.м. / день в течение 10 дней.



В период лечения животные должны получать только корм, содержащий препарат. Тиа-фуд вводят в комбикорма и кормосмеси на комбикормовых заводах или в кормоцехах хозяйств путем смешивания с зерновой частью, используя существующие технологии смешивания.

6. Период ожидания:

Убой **свиней** на мясо разрешается не ранее, чем через 6 суток после последнего применения препарата Тиа-фуд. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанных сроков, может быть использовано для кормления пушных зверей.

7. Предосторожности при применении препарата:

Побочных явлений и осложнений при применении Тиа-фуда в соответствии с настоящей инструкцией по применению, как правило, не наблюдается.

8. Меры личной профилактики

При работе с Тиа-фудом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Тиа-фудом. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

9. Условия и сроки хранения: при соблюдении условий хранения Тиа-фуда - в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 5 до 25°C - срок годности лекарственного препарата составляет 2 года со дня производства. После первого вскрытия мешка лекарственный препарат можно использовать в течение 90 суток.

10. Упаковка: полиэтиленовые мешки 25 кг, ламинированные алюминиевой фольгой.