



Ctra. Reus-Vinyols Km. 4,1 · Ap. Correos, 60
Tel. +34 977 768 864 · Fax +34 977 850 405 · 43330 RIUDOMS (Tarragona)
www.spveterinaria.com

1. Название: КОЛМИК-20

Рег.номер: РК-ВП-4-2822-14

Оральный раствор

2. Состав:

Энрофлоксацин200 мг

Наполнитель до 1 мл

3. Вид животного и показания к применению:

Колмик-20 применяется для лечения болезней бактериальной и микоплазменной этиологии у сельскохозяйственных птиц, кроликов и молодняка крупного рогатого скота.

Сельскохозяйственная птица: Лечение чувствительных к энрофлоксацину бактериальных инфекций, вызванных *E.coli*, *Salmonella* spp и *Mycoplasma* spp.

Кролики: Лечение респираторных заболеваний, вызванных *P.multocida*, чувствительных к энрофлоксацину.

Телята: Лечение кишечных и респираторных заболеваний бактериальной или микоплазменной этиологии (например, пастереллез, микоплазмоз, колибактериоз, сальмонеллез)

Перед лечением данным препаратом, рекомендуется определить чувствительность возбудителя заболевания к энрофлоксацину.

4. Противопоказания:

Запрещается применять препарат курам-несушкам и ремонтному молодняку менее, чем за 2 недели до начала яйцекладки, ввиду накопления энрофлоксацина в яйцах.



Противопоказанием для применения лекарственного препарата является индивидуальная повышенная чувствительность птицы и животных к фторхинолонам; при почечной и печеночной недостаточности; при установленной резистентности бактерий к энрофлоксацину.

5. Дозировка и способ введения:

Колмик-20 применяют с водой для поения.

Телята: Эффективная доза - 2,5-5 мг энрофлоксацина / кг живого веса / день, что соответствует 0,0125-0,025 мл Колмик-20 / кг живого веса / день, в течение 3-5 дней

Сельскохозяйственная птица (бройлер, индейка) и кролики:

Эффективная доза – 10 мг энрофлоксацина / кг живого веса / день, что соответствует 0,05 мл Колмик-20 / кг живого веса / день, в течение 3-5 дней для птицы и 5 дней для кроликов.

Для приготовления разведения Колмик-20 необходимо знать живой вес животных, которые будут получать воду с медикаментом и дневное потребление ими воды. Потребление воды может зависеть от возраста, состояния здоровья животных, породы.

Для расчета необходимого количества ветеринарного лекарственного препарата в мл на литр питьевой воды можно использовать следующую формулу:

$$\frac{0,05 \text{ мл продукта на кг живого веса в день} \times \text{приблизительный живой вес (кг) животных, которые лечатся} \times \text{число животных}}{\text{Общее потребление воды (л) поголовьем в предыдущий день}} = \text{мл продукта на литр питьевой воды}$$

В период лечения птица и животные должны получать только воду, содержащую препарат. Лечебный раствор готовят ежедневно в объеме, рассчитанном на потребление сельскохозяйственной птицей и животными в течение суток.

6. Период ожидания:

Убой на мясо разрешается не ранее чем через: птицы - 4 суток, кроликов – 2 суток, телят – 8 суток после последнего применения лекарственного препарата. Мясо птицы и животных, вынужденно убитых до истечения указанных сроков, может быть использовано для кормления пушных зверей.



7. Предосторожности при применении препарата:

Не следует применять Колмик-20 одновременно с антибиотиками тетрациклинового ряда, макролидами, линкозамидами и хлорамфениколом, в связи с возможным антагонистическим эффектом.

Абсорбция энрофлоксацина может снизиться, если Колмик-20 применяется с продуктами, содержащими магний и алюминий.

Не следует применять Колмик-20 с нестероидными продуктами.

8. Меры личной профилактики.

При работе с Колмик-20 следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы, руки следует вымыть теплой водой с мылом.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Колмик-20. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека, следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

9. Условия и сроки хранения: при соблюдении условий хранения Колмик-20 - в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 5°С до 25° С - срок годности лекарственного препарата - 3 года с даты производства. После вскрытия флакона, использовать Колмик-20 в течение 3 месяцев.

10. Упаковка: пластиковый флакон емкостью 1 и 5 литров, укупоренный крышками контроля первого вскрытия.