



## ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата

### ДОКСИПУЛ

(Организация-разработчик: S.P. Veterinaria, S.A. Ctra.Reus-Vinyols, Km.4.1, 43330, Riudoms (Tarragona), Spain / С.П. Ветеринария, С.А., Ктра.Реус-Виньольс, Км.4.1, 43330, Риудомс (Таррагона), Испания)

Номер регистрационного удостоверения: 724-3-16.24-5194 ПВМ-3-16.24/06006

#### I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Доксипул (Doxipul).  
Международное непатентованное наименование: доксициклин.
2. Лекарственная форма: порошок для перорального применения.  
Доксипул в 1 г в качестве действующего вещества содержит доксициклин (в форме гиклата) - 500 мг, что эквивалентно 577,1 мг доксициклина гиклата, а в качестве вспомогательного вещества - лимонную кислоту.
3. По внешнему виду препарат представляет собой порошок от светло-желтого до желтого цвета.  
Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения - 2 года со дня производства. Срок годности после первого вскрытия упаковки - 1 месяц. Доксипул запрещается использовать по истечении срока годности.
4. Выпускают Доксипул расфасованным в трехслойные термосвариваемые пакеты из ламинированной фольги (полиэтилен/алюминий/полипропилен) объемом 1 кг.

Каждую единицу потребительской упаковки снабжают инструкцией по применению.

5. Доксипул хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре не выше 25°C.

6. Доксипул следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

## II. Фармакологические свойства

9. Доксипул относится к антибактериальным лекарственным препаратам тетрациклиновой группы.

10. Доксициклина гиклат является антибиотиком, обладающим широким спектром антибактериального действия. Также, обладает способностью проникать внутрь клетки-мишени, воздействуя на внутриклеточных возбудителей инфекций. Механизм действия доксициклина связан с подавлением синтеза белков в микробной клетке, нарушая связывание транспортной аминоксил-РНК с рибосомальной 30S-субъединицей и вызывает гибель микробной клетки.

К доксициклину чувствительны как грам-положительные микроорганизмы: *Staphylococcus spp.* (включительно *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*), *Streptococcus spp.* (включительно *Streptococcus pneumoniae*), *Clostridium spp.*, *Listeria spp.*; *Actinomyces israeli*; так и грам-отрицательные: *Neisseria gonorrhoeae*, *Neisseria meningitidis*, *Haemophilus influenzae*, *Klebsiella spp.*, *Escherichia coli*, *Shigella spp.*, *Enterobacter*, *Salmonella spp.*, *Bordetella pertussis*, *Bacteroides spp.*, *Treponema spp.* (в том числе штаммы, резистентные к другим антибиотикам).

После перорального введения препарата доксициклин хорошо всасывается в желудочно-кишечном тракте, достигая терапевтической концентрации в плазме крови через 2-4 часа и сохраняясь на терапевтическом уровне 18-20 часов; легко проникает в большинство органов и тканей; доксициклин частично метаболизируется в печени, выводится из организма в форме неактивных комплексов преимущественно с фекалиями и в меньшей степени с мочой.

Доксипул по степени воздействия на организм относится к 4 классу токсичности по ГОСТ 32644-2014.

## III. Порядок применения

11. Доксипул назначают свиньям и сельскохозяйственной птице с лечебной и лечебно-профилактической целью при респираторных и желудочно-кишечных заболеваниях бактериальной этиологии, включая пастереллез, колибактериоз,

энзоотическую пневмонию и другие инфекции, возбудители которых чувствительны к доксициклину.

12. Противопоказанием к применению лекарственного препарата является индивидуальная повышенная чувствительность животных к компонентам препарата. Доксипул запрещается применять животным с выраженной почечной и печеночной недостаточностью, а также курам-несушкам и ремонтному молодняку кур с 16-недельного возраста в связи с накоплением доксициклина в яйцах.

13. При работе с препаратом Доксипул следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы с лекарственным препаратом вымыть руки и лицо водой с мылом.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Доксипулом.

В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Пустую упаковку лекарственного средства запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

14. Препарат не рекомендуется применять во время беременности и лактации. При использовании препарата молодняку в период роста зубов, возможно изменение цвета эмали.

15. Доксипул применяют перорально с водой для поения индивидуально или групповым способом:

- свиньям в дозе 20 мг/кг массы тела/сутки, в течение 5 дней (эквивалентно 10 мг доксициклина /кг массы тела/сутки),

- птице в дозе 30 мг/кг массы тела/сутки, в течение 3 - 5 суток (эквивалентно 15 мг доксициклина/кг массы тела/сутки, то есть 0,15 - 0,3 г/л питьевой воды).

Для правильной дозировки рекомендуется пользоваться расчетом по следующей формуле:

$$\frac{\text{Доза (г препарата / кг ж.м. животного / сутки)} \times \text{Средний вес животных (кг) для лечения}}{500 \times \text{суточное потребление воды (л) / животных / сутки}} = \text{___ г препарата на литр питьевой воды}$$

В период лечения птица и свиньи должны иметь свободный доступ к поилкам, а вода с растворенном в ней препаратом должна быть единственным источником питьевой воды, доступным на протяжении всего периода лечения. Лечебный раствор готовят ежедневно в объеме, рассчитанном на потребление в течение суток.

16. Побочных явлений и осложнений при применении Доксипула в соответствии с настоящей инструкцией по применению не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животных и птицы к доксициклину и появлении аллергических реакций использование лекарственного препарата прекращают и проводят симптоматическое лечение.

17. Симптомы передозировки при применении лекарственного препарата могут проявляться нарушением функций желудочно-кишечного тракта.

18. Не следует применять препарат совместно с антибиотиками пенициллиновой и цефалоспориновой групп ввиду возможного снижения антибактериальной активности лекарственного препарата. Одновременно с Доксипулом не рекомендуется применять антациды, каолин, а также препараты, содержащие двухвалентные катионы (железо, магний, кальций и алюминий) из-за снижения биодоступности доксициклина.

19. Особенности действия лекарственного препарата при первом приеме или при его отмене не выявлено.

20. Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной или нескольких доз курс лечения следует возобновить в предусмотренных дозах и схеме применения.

21. Убой свиней на мясо разрешается не ранее чем через 10 дней; цыплят-бройлеров - не ранее, чем 8 дней после последнего применения препарата. Мясо животных и птиц, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано в корм плотоядным животным.

Наименования и адрес производственных площадок производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

«S.P. Veterinaria, S.A.», Ctra. Reus - Vinyols, Km 4.1, 43330 Riudoms (Tarragona), Spain /  
С.П. Ветеринария, С.А.,  
Ктра. Реус - Виньолс, Км 4.1, 43330 Риудомс (Таррагона), Испания

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

«S.P. Veterinaria, S.A.», Ctra. Reus - Vinyols, Km 4.1, 43330 Riudoms (Tarragona), Spain /  
С.П. Ветеринария, С.А.  
Ктра. Реус - Виньолс, Км 4.1, 43330 Риудомс (Таррагона), Испания

Генеральный директор  
С.П.Ветеринария, С.А.

Мария Франциска Марторель

 **s.p.® veterinaria, s.a.**  
Ctra. Reus-Vinyols Km. 4.1 • 43330 RIUDOMS (Tarragona)  
[www.spveterinaria.com](http://www.spveterinaria.com)

