



Ctra. Reus-Vinyols Km. 4,1 · Ap. Correos, 60  
Tel. +34 977 768 864 · Fax +34 977 850 405 · 43330 RIUDOMS (Tarragona)  
[www.spveterinaria.com](http://www.spveterinaria.com)

**1. Название: МАРБОЦИН**

Рег.номер: РК-ВП-4-1839-12

Раствор для инъекций

**2. Состав:**

Марбофлоксацин ..... 10 г

Наполнитель ..... до 100 мл

**3. Вид животного и показания к применению:**

Марбоцин назначают **крупному рогатому скоту** для лечения респираторных заболеваний, вызываемых чувствительными к марбофлоксацину штаммов *Pasteurella multocida*, *Mannheimia haemolytica* и *Mycoplasma bovis*; лечение острого мастита у коров, вызываемого *E.coli*; и **свиньям** для лечения респираторных заболеваний, вызываемых чувствительными к марбофлоксацину штаммов *Actinobacillus peluropneumoniae*, *Mycoplasma hyopneumoniae* и *Pasteurella multocida*; для лечения синдрома ММА (мастит-метрит-агалактия) у свиноматок.

**4. Противопоказания:**

Не применять животным с гиперчувствительностью к марбофлоксацину.

**5. Дозировка и способ введения:**

Марбоцин вводят крупному рогатому скоту и свиньям **внутримышечно** один раз в сутки в течение 3-5 дней в дозе 1 мл на 50 кг живой массы (соответствует 2 мг марбофлоксацина на 1 кг живой массы).



## **6. Период ожидания:**

Убой крупного рогатого скота и свиней на мясо разрешается не ранее чем 4 суток после последнего применения продукта. Молоко, полученное от животных, которым применялся Марбоцин, разрешено к реализации не ранее 72 часов после последнего применения препарата.

## **7. Предосторожности при применении препарата:**

Марбоцин не следует применять одновременно с диуретиками, антикоагулянтами и нефротоксическими препаратами.

Марбоцин совместим с витаминами и известными кормовыми добавками, применяемыми в животноводстве.

## **8. Меры личной профилактики.**

При работе с Марбоцином следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Марбоцином. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека, следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

**9. Условия и сроки хранения:** при соблюдении условий хранения Марбоцина - в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 5°С до 25° С - срок годности лекарственного препарата 2 года с даты производства.

**10. Упаковка:** флакон на 100 мл, укупоренный резиновой пробкой и обкатанный колпачком.