



Ctra. Reus-Vinyols Km. 4,1 · Ap. Correos, 60
Tel. +34 977 768 864 · Fax +34 977 850 405 · 43330 RIUDOMS (Tarragona)
www.spveterinaria.com

1. Название: КОЛИМИЦИН

Рег.номер: РК-ВП-4-1711-11

Водорастворимый порошок

2. Состав:

Колистина сульфат 1 000 000 МЕ

Наполнитель до 1 г

3. Вид животного и показания к применению:

Колимицин используется для профилактики и лечения инфекций желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы **крупного и мелкого рогатого скота, свиней и сельскохозяйственной птицы**, вызванных грамотрицательными микроорганизмами: *E. Coli*, *Salmonella*, *Shigella*, *Proteus*, *Pseudomonas*, *Klebsiella* и др.

У **свиней** препарат используют для лечения и профилактики инфекционных процессов, вызванных *Streptococcus suis*, за исключением нервных и суставных форм проявления; у **птицы и телят-молочников** пастереллеза и колибактериоза, вызванными чувствительными к колистину возбудителями, а также сальмонеллеза.

4. Противопоказания:

Колимицин не применяется животным с почечной недостаточностью.

Не применяется курам-несушкам.

5. Дозировка и способ введения:

Лекарственный препарат применяют животным и птице с водой для поения в течение 3-4 дней в следующей дозе:

птица: 0,5 кг /1000 л воды в день;

свиньи, крупный и мелкий рогатый скот: 1 г /10 кг живой массы животного в день.



6. Период ожидания:

Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем: свиней и птицы - 7 суток; жвачных животных – 14 дней после последнего применения Колимицина. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления пушных зверей.

7. Предосторожности при применении препарата:

При повышенной индивидуальной чувствительности животного к колистину использование препарата прекращают. Не применять одновременно с миорелаксантами.

8. Меры личной профилактики.

При работе с Колимицином следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с ветеринарными лекарственными препаратами. Во время работы с препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Колимицином. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

9. Условия и сроки хранения: при соблюдении условий хранения - в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 5 до 25°C - срок годности лекарственного препарата 2 года со дня производства.

10. Упаковка: герметичные пакеты из ламинированной фольги по 1 кг.