



Ctra. Reus-Vinyols Km. 4,1 · Ap. Correos, 60  
Tel. +34 977 768 864 · Fax +34 977 850 405 · 43330 RIUDOMS (Tarragona)  
[www.spveterinaria.com](http://www.spveterinaria.com)

**1. Название:** ДОКСИ-ФУД

Рег.номер: ПВИ-2-9.9/02961

Микрогранулированный порошок для перорального применения

**2. Состав:**

Доксициклина (гидрохлорид)..... 10 г

Наполнитель ..... до 100 г

**3. Вид животного и показания к применению:**

Докси-фуд применяется для лечения и профилактики заболеваний бактериальной и микоплазменной этиологии у **свиней** и **сельскохозяйственной птицы**.

**4. Противопоказания:**

Противопоказанием к применению лекарственного препарата является индивидуальная повышенная чувствительность животных к компонентам препарата.

**5. Дозировка и способ введения:**

Докси-фуд применяют животным в смеси с кормом в суточной дозе 13 мг доксициклина на 1 кг массы животного, в течение 8 дней, что составляет примерно 250 г доксициклина на тонну корма. Учитывая, что приблизительное потребление корма составляет 50 г корма на каждый кг массы тела животного в сутки доза соответствует 2,5 кг Докси-фуда на одну тонну корма. В период лечения свиньи и птица должны получать только корм, содержащий препарат.

Потребление корма будет зависеть от клинического состояния животных. Для того, чтобы получить правильную дозировку, концентрация антибактериальной молекулы должна быть отрегулирована с учетом ежедневного потребления корма в начале лечения.



## **6. Период ожидания:**

Убой свиней и птицы на мясо разрешается не ранее, чем через 5 суток после последнего применения лечебного препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанных сроков, может быть использовано для кормления пушных зверей.

## **7. Предосторожности при применении препарата:**

Побочных явлений и осложнений при применении Докси-фуда, в соответствии с настоящей инструкцией по применению, как правило, не наблюдается.

## **8. Меры личной профилактики.**

При работе с Докси-фудом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Докси-фудом. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

**9. Условия и сроки хранения:** при соблюдении условий хранения Докси-фуда - в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 5 до 25°C - срок годности лекарственного препарата составляет 2 года со дня производства. После первого вскрытия мешка лекарственный препарат можно использовать в течение 90 суток.

**10. Упаковка:** полиэтиленовые мешки, ламинированные алюминиевой фольгой, емкостью по 25 кг.