



Ctra. Reus-Vinyols Km. 4,1 · Ap. Correos, 60  
Tel. +34 977 768 864 · Fax +34 977 850 405 · 43330 RIUDOMS (Tarragona)  
[www.spveterinaria.com](http://www.spveterinaria.com)

**1. Название:** ГЕПАТОВЕКС К

Рег.номер: 724-3-36.12-1185№ПВИ-3-3.7/02195

Оральный раствор

**2. Состав:**

L-Карнитин ..... 5 г  
DL-Метионин ..... 1,5 г  
L-Лизин HCl ..... 1 г  
Холин хлорид ..... 5 г  
Витамин B12 ..... 1 мг  
Маннитол ..... 6,5 г  
Натрия хлорид ..... 10 г  
Калия хлорид ..... 7,5 г  
Сорбитол ..... 10 г  
Наполнитель ..... до 100 мл

**3. Вид животного и показания к применению:**

Гепатовекс-К применяют для нормализации профилактики жировой, токсической дистрофии печени, гиповитоминозов B<sub>12</sub> и B<sub>4</sub>, стрессов у **свиней** и **сельскохозяйственной птицы**.

**4. Противопоказания:**

Индивидуальная повышенная чувствительность животных к компонентам препарата.

**5. Дозировка и способ введения:**

Гепатовекс К применяют орально с водой для поения в следующих дозах:

**Птица:**



- геморрогической и жировой дистрофии печени у несушек – 1 мл / л воды в течение 5 дней. Повторять обработки каждые 3-4 недели, начиная с 20-30 недели жизни.

- липоидного стеатоза и ожирения печени на начальной стадии у бройлеров - 1 мл / л воды в течение 5 дней. Повторять обработки каждые 2 недели.

- после длительного лечения антибактериальными средствами и кокцидиостатиками, вакцинации и при интоксикации: 1 мл / л воды в течение 5 дней

**Свиньи** – 1 мл / л воды в течение 7-10 дней.

В период лечения свиньи и сельскохозяйственная птица должны получать только воду, содержащую препарата. Лечебный раствор готовят ежедневно в объеме, рассчитанном на потребление животным и птице в течение суток.

#### **6. Период ожидания:**

Использование продукции от свиней и сельскохозяйственной птицы после применения Гепатовекс К разрешается без ограничений.

#### **7. Предосторожности при применении препарата:**

Не использовать Гидро Рекс Минерал одновременно с антибактериальными препаратами тетрациклинового ряда.

#### **8. Меры личной профилактики:**

При работе с Гепатовекс К следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Гепатовекс К. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека, следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).



**9. Условия и сроки хранения:**

При хранении продукта в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 5 до 25°C - срок хранения составляет 2 года со дня изготовления. После первого вскрытия флакона лекарственный препарат можно использовать в течение 30 суток при температуре хранения 10-15°C.

**10. Упаковка:** полиэтиленовые канистры по 5 л, снабженные закручивающимися пробками со стоппером.