



Ctra. Reus-Vinyols Km. 4,1 · Ap. Correos, 60
Tel. +34 977 768 864 · Fax +34 977 850 405 · 43330 RIUDOMS (Tarragona)
www.spveterinaria.com

1. Название: ТЕТРАЛОНГ-20

Рег.номер: 724-3-21.13-1509 № ПВИ-3-0.2/01202

Раствор для инъекций

2. Состав:

Окситетрациклин 200 мг

Наполнитель до 1 мл

3. Вид животного и показания к применению:

Применяют для лечения **свиней, крупного и мелкого рогатого скота** при острых и хронических заболеваний органов дыхания, мочеполовой системы, опорно-двигательного аппарата, колибактериозе, сальмонеллезе, пастереллезе, лептоспироз, гастроэнтероколите, мастите, операционных, раневых, послеродовых осложнений и других первичных и вторичных инфекциях бактериальной этиологии, возбудители которых чувствительны к тетрациклинам

4. Противопоказания:

Не применять животным, имеющим индивидуальную чувствительность к тетрациклинам.

Не применять животным с печеночной или почечной недостаточностью.

Не применять молодняку в период развития зубов, а также самкам во время беременности.

5. Доза и способ введения:

Применяют животным однократно глубоко **внутримышечно** в дозе 1 мл на 10 кг массы животного (соответствует 20 мг окситетрациклина на 1 кг массы животного). При необходимости, препарат вводят повторно через 72 часа.

При применении препарата **поросьям массой менее 10 кг** максимальная разовая доза Тетралонг-20 составляет 1 мл на животное, **подкожно**.

При **атрофическом рините поросятам** препарат вводят на 3, 12 и 21 день жизни в дозе 1 мл на одно животное.



При лечении **некробактериоза и риккетсиозов у ягнят** препарат применяют в дозе 2 мл на животное.

6. Период ожидания

Убой крупного и мелкого рогатого скота, а также свиней на мясо разрешается не ранее, чем через 28 дней после последнего применения Тетралонг-20. Молоко дойных животных разрешается использовать для пищевых целей, не ранее, чем через 3 дня после последнего введения лекарственного средства.

7. Предосторожности при применении препарата:

Тетралонг-20 не рекомендуется применять одновременно с кортикостероидными и эстрогенами, а также совместно с бактерицидными препаратами ввиду возможного снижения антибактериального эффекта.

8. Предосторожности при работе с продуктом оператором.

При работе с Тетралонг-20 следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Тетралонг-20. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека, следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

9. Условия и сроки хранения: При соблюдении условий хранения Тетралонг-20 - в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 5°C до 25° С - срок годности лекарственного препарата 2 года с даты производства.

10. Упаковка: флакон емкостью 100 мл из темного стекла, укупоренный резиновой пробкой и укрепленный алюминиевым колпачком.