



Ctra. Reus-Vinyols Km. 4,1 · Ap. Correos, 60
Tel. +34 977 768 864 · Fax +34 977 850 405 · 43330 RIUDOMS (Tarragona)
www.spveterinaria.com

1. Название: АВИДОКС Рег.номер: 724-3-3.16-3097 №ПВИ-3-3.16/03376

Водорастворимый порошок

2. Состав:

Доксициклин (хиклат) 5 г

Колистин (сульфат) 25.000.000 МЕ

Наполнитель до 100 г

3. Вид животного и показания к применению:

Применяют цыплятам-бройлерам и ремонтному молодняку кур с лечебной и лечебно-профилактической целью при хронических респираторных заболеваниях, колибактериозе, сальмонеллезе, пастереллезе, стафилококкозе, стрептококкозе, микоплазмозе, и других инфекциях, возбудители которых чувствительны к доксициклину и колистину.

4. Противопоказания:

Авидокс не применяют при повышенной индивидуальной чувствительности птицы к тетрациклинам и ремонтному молодняку кур старше 16-недельного возраста, а также запрещается применять курам-несушкам в связи с выделением доксициклина с яйцом.

5. Дозировка и способ введения:

Лекарственный препарат применяют птице перорально с водой для поения или в смеси с кормом в течение 3-5 суток в дозе: 1 кг /1000 л воды или 2 кг препарата на 1 тонну корма.

Лечебный раствор Авидокса готовят ежедневно в расчете на потребление птицей в течение суток.



6. Период ожидания:

Убой птицы на мясо разрешается не ранее, чем через 14 суток после последнего применения Авидокса. Мясо птиц, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано в корм пушным зверям.

7. Предосторожности при применении препарата:

Не следует применять совместно с бактерицидными антибиотиками пенициллиновой и цефалоспориновой групп, минеральными добавками и лекарственными препаратами, содержащими соли кальция, магния и алюминия, ввиду возможного снижения антибактериальной активности.

Запрещается применять совместно с мышечными релаксантами, в связи с риском ускорения нейро-мышечной блокады и, как следствие, возможный паралич верхних дыхательных путей.

8. Меры личной профилактики.

При работе с Авидоксом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с ветеринарными лекарственными препаратами. Во время работы с препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Авидоксом. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

9. Условия и сроки хранения: при соблюдении условий хранения - в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 5 до 25°C - срок годности лекарственного препарата 2 года со дня производства.

10. Упаковка: герметичные пакеты из ламинированной фольги по 1 кг и 5 кг.