



Ctra. Reus-Vinyols Km. 4,1 · Ap. Correos, 60
Tel. +34 977 768 864 · Fax +34 977 850 405 · 43330 RIUDOMS (Tarragona)
www.spveterinaria.com

1. Название: ЦЕФАЛЕКС-50

Рег.номер: РК-ВП-4-1891-12

Порошок для орального применения

2. Состав:

Цефалексин 500 мг

Наполнитель до 1 г

3. Вид животного и показания к применению:

Цефалекс-50 применяют с лечебной и лечебно-профилактической целью для **сельскохозяйственной птицы, свиней, крупного и мелкого рогатого скота** при колибактериозе, сальмонеллезе, стафилококкозе, стрептококкозе, некротическом энтерите и других заболеваниях, вызванных чувствительными к нему бактериями.

4. Противопоказания:

Противопоказанием к применению лекарственного препарата является индивидуальная повышенная чувствительность животных к цефалоспоринолу.

Запрещается применять Цефалекс-50 жвачным животным более 5 дней, в связи с возможным угнетением рубцовой микрофлоры.

5. Дозировка и способ введения:

Перорально с водой для поения в течение 3-5 дней, в дозе:

сельскохозяйственной птице - 0,2-0,4 г/л;

свиньям, телятам и ягнятам - с водой для поения или молоком 0,15-0,3 г/л.

В период лечения птица должна получать только воду, содержащую препарат. Лечебный раствор готовят ежедневно в объеме, рассчитанном на потребление птицей в течение суток.



6. Период ожидания:

Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 2 дня после последнего применения Цефалекс-50. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления пушных зверей.

7. Предосторожности при применении препарата:

Побочных явлений и осложнений при применении Цефалекс-50 в соответствии с настоящей инструкцией по применению, как правило не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к фторхинолонам и появлении побочных явлений (отказ от корма, рвота, отеки, нарушение координации движений) использование лекарственного средства прекращают и проводят десенсибилизирующую терапию.

8. Меры личной профилактики

При работе с Цефалекс-50 следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с ветеринарными лекарственными препаратами. Во время работы с препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Цефалекс-50. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

9. Условия и сроки хранения: при соблюдении условий хранения - в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 5 до 25°C - срок годности лекарственного препарата 2 года со дня производства.

10. Упаковка: пакеты из алюминиевой фольги по 0,5 кг, упакованные по 20 штук в картонные коробки.