



Ctra. Reus-Vinyols Km. 4,1 · Ap. Correos, 60
Tel. +34 977 768 864 · Fax +34 977 850 405 · 43330 RIUDOMS (Tarragona)
www.spveterinaria.com

1. Название: БРОНХОДОКС

Рег.номер: РК-ВП-4-1889-12

Оральный раствор

2. Состав:

Доксициклина (гиклат)100 мг

Бромгексин 10 мг

Наполнитель до 1 мл

3. Вид животного и показания к применению:

Бронходокс назначают с лечебной и лечебно-профилактической целью **свиньям, жвачным животным и сельскохозяйственной птице** при респираторных заболеваниях бактериальной этиологии, в т.ч. пастереллезе, микоплазмозе, колибактериозе, сальмонеллезе, дизентерии, энзоотической пневмонии и других инфекциях, возбудители которых чувствительны к доксициклину.

4. Противопоказания:

Индивидуальная повышенная чувствительность животных к доксициклину и бромгексину.

Запрещается применять препарат жвачным животным с развитым рубцовым пищеварением, курам-несушкам, а также животным с выраженной почечной и печеночной недостаточностью.

5. Дозировка и способ введения:

Бронходокс применяют орально с водой для поения в следующих дозах:

Птице: 0,5-1,0 мл/л воды в течение 3-5 дней (соответствует 50 - 100 мг доксициклина + 5-10 мг бромгексина / литр питьевой воды / день).



Свиньям и жвачным животным: 1 мл/10 кг массы животного в течение 5 дней (соответствует 10 мг доксицилина + 1 мг бромгексина / кг ж.м. / день).

В период лечения животные должны получать только воду, содержащую препарат. Лечебный раствор готовят ежедневно в объеме, рассчитанном на потребление сельскохозяйственными животными и птицей в течение суток.

6. Период ожидания:

Убой животных, в том числе птицы, на мясо разрешается не ранее, чем через 7 суток после последнего применения Бронходокса. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанных сроков, может быть использовано для кормления пушных зверей.

7. Предосторожности при применении препарата:

Не следует применять Бронходокс совместно с миорелаксантами, бактерицидными антибиотиками пенициллиновой и цефалоспориновой групп, минеральными добавками и лекарственными препаратами, содержащими соли кальция, магния, железа и алюминия, ввиду возможного снижения антибактериальной активности.

8. Меры личной профилактики.

При работе с Бронходоксом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Бронходоксом. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека, следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

9. Условия и сроки хранения: при соблюдении условий хранения Бронходокса - в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 5°C до 25° С - срок годности лекарственного препарата - 2 года с даты производства.

10. Упаковка: полиэтиленовые бутылки (1 литр) и канистры (5 литров) с навинчиваемыми пробками со стопором, упакованных по 12 и 4 штуки в картонные коробки.