



Ctra. Reus-Vinyols Km. 4,1 · Ap. Correos, 60
Tel. +34 977 768 864 · Fax +34 977 850 405 · 43330 RIUDOMS (Tarragona)
www.spveterinaria.com

1. Название: ДЕКСАФЛОР

Рег.номер: РК-ВП-4-1825-12

Раствор для инъекций

2. Состав:

Флорфеникол 30 г

Дексаметазон 0,12 г

Наполнитель до 1 мл

3. Вид животного и показания к применению:

Дексафлор применяют с лечебной целью **крупному рогатому скоту** для лечения респираторных болезней, в том числе вызванных *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida* и *Histophilus somni* сопровождающихся лихорадкой. А также для лечения **свиней** при острых вспышках респираторных заболеваний, в том числе вызванных штаммами *Actinobacillus pleuropneumoniae* и *Pasteurella multocida*, чувствительным к флорфениколу.

4. Противопоказания:

Не использовать хрякам и быкам-производителям.

Не использовать, если есть риск желудочно-кишечного кровотечения или в тех случаях, когда есть признаки изменения гемостаза у животного.

Не следует применять животным при повышенной чувствительности к составляющим препарата, страдающих патологиями сердца, печеночной и почечной недостаточностью.

Не применять животным в возрасте менее 6-недель.

Не использовать препарат для самок, производящих молоко для потребления, в течение лактации или периода прекращения лактации, а также в течение 2 месяцев до родов у животных, используемых для выработки молока для потребления в будущем.



5. Дозировка и способ введения:

Крупный рогатый скот: 1 мл Дексафлора / 15 кг массы тела животного (эквивалентно: 20 мг флорфеникола и 0,08 мг дексаметазона на 1 кг массы) вводится дважды с **48-часовым интервалом**. Одна инъекция не должна превышать 10 мл в одно место.

Свиньи: 1 мл Дексафлора на 20 кг массы тела животного (эквивалентно: 15 мг флорфеникола и 0,06 дексаметазона на кг массы). Вводится дважды с интервалом 48 часов. Одна инъекция не должна превышать 3 мл в одно место.

Рекомендуется лечить животных на ранних стадиях заболевания с последующей оценкой результатов лечения через 48 часов после введения препарата.

Инъекция должна вводиться только в шею.

6. Период ожидания:

Убой крупного рогатого скота на мясо разрешается не ранее, чем через 30 дней и свиней 18 дней после последнего применения Дексафлора. Не использовать для лактирующих самок, молоко которых идет на пищевые цели.

7. Предосторожности при применении препарата:

В связи с возможной болевой реакцией не следует вводить в одно место взрослому крупному рогатому скоту более 15 мл, овцам, телятам и свиньям более 5 мл, пороссятам более 2,5 мл лекарственного препарата. После введения препарата рекомендуется массировать место инъекции.

8. Меры личной профилактики.

При работе с Дексафлором следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Дексафлором. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека, следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).



9. Условия и сроки хранения:

При соблюдении условий хранения Дексафлора - в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 5°С до 25° С - срок годности лекарственного препарата 2 года с даты производства.

10. Упаковка: полипропиленовый флакон емкостью на 100 мл, герметично упакованный резиновой пробкой, укрепленной алюминиевым колпачком.