



Ctra. Reus-Vinyols Km. 4,1 · Ap. Correos, 60
Tel. +34 977 768 864 · Fax +34 977 850 405 · 43330 RIUDOMS (Tarragona)
www.spveterinaria.com

1. Название: СУЛЬФА-ФУД

Рег.номер: РК-ВП-4-2823-14

Микрогранулированный порошок для перорального применения

2. Состав:

Сульфадиазин 250 мг

Триметоприм 50 мг

Наполнитель до 100 г

3. Вид животного и показания к применению:

Сульфа-фуд применяется для лечения и профилактики заболеваний респираторного тракта, диареи вызванной *E.coli*, атрофического ринита и синдрома ММА у **свиней**.

4. Противопоказания:

Противопоказанием к применению лекарственного препарата является индивидуальная повышенная чувствительность животных к компонентам препарата.

5. Дозировка и способ введения:

Сульфа-фуд применяют животным в смеси с кормом из расчета: 25 мг сульфадиазина + 5 мг триметоприма / кг живого массы животного в день, на протяжении 5 дней подряд.

Зная, что потребление корма животным может меняться в зависимости от его клинического состояния, производственного периода и генетических характеристик, облегчая расчет правильного дозирования предлагается следующая таблица:



Ежедневное потребление корма в % к живому весу свиньи	Количество СУЛЬФА-Фуда для добавления в тонну корма
2%	5 кг
3%	3,3 кг
4%	2,5 кг
5%	2 кг

или

Живой вес поросенка, кг	СУЛЬФА Фуд
от 0 до 60	2 кг / т
от 60 до 80	2,2 кг / т
от 80 до 100	3,3 кг / т

В период лечения свиньи должны получать только корм, который содержащий препарат.

Сульфа-фуд вводят в комбикорма и кормосмеси на комбикормовых заводах или в кормоцехах хозяйств путем смешивания с зерновой частью, используя существующие технологии смешивания.

6. Период ожидания:

Убой свиней на мясо разрешается не ранее, чем через 5 суток после последнего применения лечебного препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанных сроков, может быть использовано для кормления пушных зверей.

7. Предосторожности при применении препарата:

Побочных явлений и осложнений при применении Сульфа-фуда, в соответствии с настоящей инструкцией по применению, как правило, не наблюдается.

8. Меры личной профилактики.

При работе с Сульфа-фудом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Сульфа-фудом. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

9. Условия и сроки хранения: при соблюдении условий хранения Сульфа-фуда - в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 5 до 25°C - срок годности лекарственного препарата составляет 2 года со дня производства. После первого вскрытия мешка лекарственный препарат можно использовать в течение 90 суток.

10. Упаковка: полиэтиленовые мешки, ламинированные алюминиевой фольгой, емкостью по 25 кг.